

アルミノックス(光免疫療法)

■エンボス

【歯科】26【頭頸部癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	~28
施行日	/	
アキシャルクス	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順			
①	<table border="1"> <tr> <td>ポララミン注5mg 1A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL</td> <td>30分</td> </tr> </table>	ポララミン注5mg 1A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL	30分
ポララミン注5mg 1A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL	30分		
②	<table border="1"> <tr> <td>●アキシャルクス ()mg</td> <td>2時間</td> </tr> </table>	●アキシャルクス ()mg	2時間
●アキシャルクス ()mg	2時間		
③	<table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分</td> </tr> </table>	生食 50mL	10分
生食 50mL	10分		

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
アキシャルクス	640mg/m ²	mg/Body

■注意・確認事項

- アキシャルクス投与中又は24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- アキシャルクス投与終了20-28時間後にレーザー光を病巣部位に照射する。
- 完全奏効が得られない場合は、4週間以上の間隔をあけて、最大4回まで本治療を行うことができる。
- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 常に遮光カバーで点滴静注バッグを被覆するとともに、アキシャルクスの投与を行う部屋の窓はカーテンやブラインド等で覆うこと。

入力 薬剤師	看護師	看護師