

サイラムザ+ロンサーフ療法【30分】

【外科】【胃癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	~28
施行日	/	/			/
サイラムザ	↓	休薬	↓	休薬	休薬
ロンサーフ	経口: Day1(夕)~Day6(朝)		経口: Day8(夕)~Day13(朝)		

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順											
①	<table border="1"> <tr> <td>ポララミン注 1A 生食 50mL</td> <td>10分</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>●サイラムザ注【 】mg 生食 250mL</td> <td>30分</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分 フラッシュ</td> </tr> </table>	ポララミン注 1A 生食 50mL	10分	↓		●サイラムザ注【 】mg 生食 250mL	30分	↓		生食 50mL	10分 フラッシュ
ポララミン注 1A 生食 50mL	10分										
↓											
●サイラムザ注【 】mg 生食 250mL	30分										
↓											
生食 50mL	10分 フラッシュ										
②											
③											

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
サイラムザ注	8mg/kg
ロンサーフ	70mg/m ² /日

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- サイラムザは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分まで短縮できる。

入力 薬剤師	看護師	看護師