

SOX(130mg/m²)療法

【外科】134【進行性・再発大腸癌、胃癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名: 印	

身長: cm	体重: kg
体表面積: m²	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
エルプラット	↓	休薬	休薬	休薬
エスワン	経口: Day1(夕)~Day15(朝)			

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセトンバッグ 100mL </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">30分</div>
②		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ●エルプラット注【]mg 5%ブドウ糖 500mL デキサート注1.65mg 1A </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">2時間</div>
③		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 生食 50mL </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">10分 フラッシュ</div>

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	※エスワンの1日投与量	
エルプラット注	130 mg/m ² mg/Body	<1.25	80mg/Body/分2
エスワン	※投与量の参考	1.25- $<$ 1.5	100mg/Body/分2
		1.5 \leq	120mg/Body/分2

■注意・確認事項

- エスワンは2週投与1週休薬。
- エルプラット注は塩化物・塩基性溶液との混和は不可。

入力 薬剤師	看護師	看護師