

# キイトルーダ+SOX(130mg/m<sup>2</sup>)療法

**【外科】258【胃癌】**  
**(第 コース目)**

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m <sup>2</sup>	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
キイトルーダ	↓	休薬	休薬	休薬
エルプラット	↓	休薬	休薬	休薬
エスワン	経口: Day1(夕)~Day15(朝)			

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●キイトルーダ注【 】mg 生食 50mL 30分
③	生食 50mL 10分
④	デキサート注1.65mg 2A アロカリス注235mg 1V グラニセトロンバッグ 100mL 30分
⑤	●エルプラット注【 】mg 5%ブドウ糖 500mL デキサート注1.65mg 1A 2時間
⑥	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	※エスワンの1日投与量	
キイトルーダ注	200mg/Body	<1.25	80mg/Body/分2
エルプラット注	130 mg/m <sup>2</sup>   mg/Body	1.25~<1.5	100mg/Body/分2
エスワン	※投与量の参考	1.5≦	120mg/Body/分2

入力薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- エスワンは2週投与1週休薬。
- エルプラット注は塩化物・塩基性溶液との混和は不可。
- 外来から初回導入となる場合は、インフュージョンリアクションの観察の為、点滴終了1時間後に医師の診察を受け、帰宅の許可を得ること。