

キイトルーダ+XELOX療法

【外科】259【胃癌】
 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
キイトルーダ	↓	休薬	休薬	休薬
エルプラット	↓	休薬	休薬	休薬
ゼローダ	経口: Day1(夕)~Day15(朝)			

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①	生食 50mL	10分
②	●キイトルーダ注【 】mg 生食 50mL	30分
③	生食 50mL	10分
④	デキサート注1.65mg 2A アロカリス注235mg 1V グラニセトンバッグ 100mL	30分
⑤	●エルプラット注【 】mg 5%ブドウ糖 500mL デキサート注1.65mg 1A	2時間
⑥	生食 50mL	10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
キイトルーダ注	200mg/Body	
エルプラット注	130 mg/m ²	mg/Body
ゼローダ錠	2000 mg/m ² /分2	mg/Body

※ゼローダ錠は2週間連日投与後、1週間休薬。

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- エルプラット注は塩化物・塩基性溶液との混和は不可。
- 外来から初回導入となる場合は、インフュージョンリアクションの観察の為、点滴終了1時間後に医師の診察を受け、帰宅の許可を得ること。