

ビラフトビ+メクトビ+アービタックス(2週毎)療法

■エンボス

【外科】260【進行性・再発大腸癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 2週ごとを1コースとする

Day	1	8	~14
施行日	/		
アービタックス	↓		
ビラフトビ	経口: 連日投与		
メクトビ	経口: 連日投与		

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	ポララミン注5mg 1A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
②	●アービタックス【 】mg 生食 250mL 2時間
③	生食 100mL 30分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
アービタックス	500mg/m ²	mg/Body
ビラフトビ	1回300mg	1日1回
メクトビ	1回45mg	1日2回

■注意・確認事項

- アービタックス投与中又は24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- 大腸癌組織でのBRAF遺伝子変異を認める症例に使用すること。
- 2nd line 以降に使用すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師