

Avastin+アクプラ療法【30分】

【婦人科】【卵巣癌・子宮頸癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
アバステン	↓	休薬	休薬	
アクプラ	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●アバステン【 】mg 生食 100mL 30分
③	生食 50mL 10分
④	アロカリス注235mg 1V デキサート注6.6mg 1V デキサート注1.65mg 2A ポララミン注5mg 1A グラニセトンバッグ 100mL 30分
⑤	●アクプラ【 】mg 生食 500mL 2時間
⑥	生食 50mL 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
アバステン	15 mg/kg
アクプラ	80 mg/m ²

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- アバステンは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。
2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。
- アバステンとブドウ糖溶液を混合した場合、アバステンの力価の減弱が生じるおそれがあるため、
ブドウ糖溶液との混合を避け、アバステンとブドウ糖溶液の同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと。
- 腎機能に応じて、副作用軽減のための点滴(ハイドレーション)を考慮すること。