

■エンボス

Avastin+カルボプラチン療法【30分】

【婦人科】【卵巣癌・子宮頸癌】 （第 コース目）

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
アバステン	↓	休薬	休薬	
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順			
①	<table border="1"> <tr> <td>アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセトンバッグ 100mL</td> <td>30分</td> </tr> </table>	アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセトンバッグ 100mL	30分
アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセトンバッグ 100mL	30分		
②	<table border="1"> <tr> <td>●アバステン【 】mg 生食 100mL</td> <td>30分</td> </tr> </table>	●アバステン【 】mg 生食 100mL	30分
●アバステン【 】mg 生食 100mL	30分		
③	<table border="1"> <tr> <td>●カルボプラチン注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL</td> <td>1時間</td> </tr> </table>	●カルボプラチン注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL	1時間
●カルボプラチン注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL	1時間		
④	<table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分 フラッシュ</td> </tr> </table>	生食 50mL	10分 フラッシュ
生食 50mL	10分 フラッシュ		

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
アバステン	15 mg/kg
カルボプラチン	AUC=5

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- アバステンは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。
2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。
- アバステンとブドウ糖溶液を混合した場合、アバステンの力価の減弱が生じるおそれがあるため、
ブドウ糖溶液との混合を避け、アバステンとブドウ糖溶液の同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと。