

Avastin+ジェムザール療法【30分】

【婦人科】○-1【卵巣癌】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
アバスタチン	↓	休薬	休薬	
ジェムザール	↓	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	時間	投与内容	時間
①	10時	デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL	30分
②	10時30分	●アバスタチン【 】mg 生食 100mL	30分
③	11時	生食 50mL	10分
④	11時10分	●ジェムザール【 】mg 生食 100mL	30分
⑤	11時40分	生食 50mL	10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
アバスタチン	15 mg/kg
ジェムザール	1000 mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

- ジェムザール投与は30分前後で投与する。(60分以上かかると副作用が増強した例が報告されている。)
- アバスタチンは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。
2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。
- アバスタチンとブドウ糖溶液を混合した場合、アバスタチンの力価の減弱が生じるおそれがあるため、ブドウ糖溶液との混合を避け、アバスタチンとブドウ糖溶液の同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと。

薬剤師	看護師	看護師