

# タグリッソ+ペトレキセド+カルボプラチン療法

## 【呼吸器科】140【非小細胞肺癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

|      |     |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印   |

|       |                |     |       |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長:   | cm             | 体重: | kg    |
| 体表面積: | m <sup>2</sup> | Cr: | mg/dL |

### ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

| Day         | -8                                   | 1       | 8  | 15 | ~21 |
|-------------|--------------------------------------|---------|----|----|-----|
| 施行日         | /                                    | /       | /  | /  | /   |
| タグリッソ       |                                      | 経口:連日投与 |    |    |     |
| ペトレキセド      |                                      | ↓       | 休薬 | 休薬 | 休薬  |
| カルボプラチン     |                                      | ↓       | 休薬 | 休薬 | 休薬  |
| パンビタン末(経口)  | 初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。 |         |    |    |     |
| メコバラミン注(筋注) | ↓                                    |         |    |    |     |

メコバラミン注(ビタミンB12):初回投与の少なくとも7日前に、1回1mgを筋肉内投与する。その後、9週毎(3コース毎)に1回投与する。

### ■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 |   |
|-----|---|
| ①   | アロカリス注235mg 1V<br>デキサート注1.65mg 2A<br>グラニセトロンバッグ 100mL 30分 |
| ②   | ●ペトレキセド【 】mg<br>生食 100mL 10分                              |
| ③   | ●カルボプラチン【 】mg<br>5%ブドウ糖液 250mL 1時間                        |
| ④   | 生食 50mL 10分 フラッシュ   |

### ■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名     | 標準投与量                 |         |
|---------|-----------------------|---------|
| タグリッソ   | 1回80mg                | 1日1回    |
| ペトレキセド  | 500 mg/m <sup>2</sup> | mg/Body |
| カルボプラチン | AUC=5                 | mg/Body |

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|     |     |     |

### ■注意・確認事項

- NSAIDsとの併用は注意して下さい。
- 1週間以上前から葉酸を服用していることと、ビタミンB12の筋肉内注射投与を受けたことを確認すること。
- タグリッソ+ペトレキセド+カルボプラチン療法は最大4コースまで投与する。
- 本レジメン終了後は、病状に応じてタグリッソ+ペトレキセドによる維持療法を行う。