

タグリッソ+ペトレキセド療法

【呼吸器科】141【非小細胞肺癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m ²	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

Day	-8	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/
タグリッソ		経口:連日投与			
ペトレキセド		↓	休薬	休薬	休薬
パンビタン末(経口)	初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。				
メコバラミン注(筋注)	↓				

メコバラミン注(ビタミンB12): 初回投与の少なくとも7日前に、1回1mgを筋肉内投与する。その後、9週毎(3コース毎)に1回投与する。

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
②	●ペトレキセド【 】mg 生食 100mL 10分
③	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
タグリッソ	1回80mg	1日1回
ペトレキセド	500 mg/m ²	mg/Body

■注意・確認事項

- NSAIDsとの併用は注意して下さい。
- 1週間以上前から葉酸を服用していることと、ビタミンB12の筋肉内注射投与を受けたことを確認すること。
- タグリッソ+ペトレキセド投与後の維持療法として行う。
- ペトレキセドの継続の可否は、病状、腎機能を評価して適宜、判断する。

薬剤師	看護師	看護師