

■エンボス

# 術前キイトルーダ+ランダ+ゲムシタビン(SH)療法(Day8)

## 【呼吸器科】142-8【非小細胞肺癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
キイトルーダ	↓	休薬	休薬	
ランダ	↓	休薬	休薬	
ゲムシタビン	↓	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     デキサート注6.6mg 1V                      生食 100mL                 </div> 30分
②	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     ●ゲムシタビン【      】mg                      生食 100mL                 </div> 30分
③	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     生食 50mL                 </div> 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
キイトルーダ	200mg/Body
ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup> mg/Body
ランダ	75 mg/m <sup>2</sup> mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○ゲムシタビン投与は30分前後で投与する。(60分以上かかると副作用が増強した例が報告されている。)