

# パドセブ+キイトルーダ療法(Day1)

## 【泌尿器科】56-1【尿路上皮癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m <sup>2</sup>	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
パドセブ	↓	↓	休薬	休薬
キイトルーダ	↓	休薬	休薬	休薬

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順							
①	<table border="1"> <tr> <td>デキサート注6.6mg 1V</td> <td>30分</td> </tr> <tr> <td>生食 100mL</td> <td></td> </tr> </table>	デキサート注6.6mg 1V	30分	生食 100mL			
デキサート注6.6mg 1V	30分						
生食 100mL							
②	<table border="1"> <tr> <td>●パドセブ【 】mg</td> <td>30分</td> </tr> <tr> <td>注射用水 20mL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生食 50mL</td> <td></td> </tr> </table>	●パドセブ【 】mg	30分	注射用水 20mL		生食 50mL	
●パドセブ【 】mg	30分						
注射用水 20mL							
生食 50mL							
③	<table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分</td> </tr> </table>	生食 50mL	10分				
生食 50mL	10分						
④	<table border="1"> <tr> <td>●キイトルーダ【 】mg</td> <td>30分</td> </tr> <tr> <td>生食 50mL</td> <td></td> </tr> </table>	●キイトルーダ【 】mg	30分	生食 50mL			
●キイトルーダ【 】mg	30分						
生食 50mL							
⑤	<table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分 フラッシュ</td> </tr> </table>	生食 50mL	10分 フラッシュ				
生食 50mL	10分 フラッシュ						

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
パドセブ	1.25 mg/kg	mg/Body
キイトルーダ	200mg/Body	

※1回量として125mg/Bodyを超えないこと。

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 外来から初回導入となる場合は、インフュージョンリアクションの観察の為、点滴終了1時間後に医師の診察を受け、帰宅の許可を得ること。
- 高血糖があらわれることがあるので、本剤投与開始前及び投与中は定期的に血液検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。

入力薬剤師	看護師	看護師