

■エンボス

パドセブ+キイトルーダ療法(Day8)

【泌尿器科】56-8【尿路上皮癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
パドセブ	↓	↓	休薬	休薬
キイトルーダ	↓	休薬	休薬	休薬

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順			
①	<table border="1"> <tr> <td>デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL</td> <td>30分</td> </tr> </table>	デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL	30分
デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL	30分		
②	<table border="1"> <tr> <td>●パドセブ【 】mg 注射用水 20mL 生食 50mL</td> <td>30分</td> </tr> </table>	●パドセブ【 】mg 注射用水 20mL 生食 50mL	30分
●パドセブ【 】mg 注射用水 20mL 生食 50mL	30分		
③	<table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分フラッシュ</td> </tr> </table>	生食 50mL	10分フラッシュ
生食 50mL	10分フラッシュ		

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
パドセブ	1.25 mg/kg mg/Body ※1回量として125mg/Bodyを超えないこと。
キイトルーダ	200mg/Body

■注意・確認事項

○高血糖があらわれることがあるので、本剤投与開始前及び投与中は定期的に血液検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師