

[short hydration(適応:75歳未満)]

■エンボス

ハイカムチン+ランダ(SH)療法(Day1)

【婦人科】105-1【子宮頸癌】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

| | |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印 |

| | | | |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長: | cm | 体重: | kg |
| 体表面積: | m ² | Cr: | mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

| | | | | |
|--------|---|----|----|-----|
| Day | 1 | 2 | 3 | ~21 |
| 施行日 | / | / | / | |
| ハイカムチン | ↓ | ↓ | ↓ | |
| ランダ | ↓ | 休薬 | 休薬 | |

■投与タイムテーブル

| 滴下順 | |
|-----|--|
| ① | アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A デキサート注6.6mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V 生食 100mL 30分 |
| ② | ●ハイカムチン【 】mg 生食 100mL 30分 |
| ③ | KCL注10mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL 1時間 |
| ④ | マンニトールS 300mL 30分 |
| ⑤ | ●ランダ【 】mg 生食 500mL 1時間 |
| ⑥ | KCL注10mEq 生食 500mL 1時間 |

■投与量

※投与量の参考

| 薬剤名 | 標準投与量 | |
|--------|------------------------|---------|
| ハイカムチン | 0.75 mg/m ² | mg/Body |
| ランダ | 50 mg/m ² | mg/Body |

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 入力 薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
| | | |

■注意・確認事項

○75歳未満の患者を対象とする。

○腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。