

[short hydration(適応:75歳未満)]

■エンボス

Weeklyランダ+キイトルーダ+RT(SH)療法(Day1,22)

【婦人科】107-1,22【子宮頸癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール:

Day	1	8	15	22	29	36
施行日	/	/	/	/	/	/
キイトルーダ	↓	休薬	休薬	↓	休薬	休薬
ランダ	↓	↓	↓	↓	↓	↓

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●キイトルーダ【 】mg 生食 50mL 30分
③	生食 50mL 10分
④	アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注1.65mg 2A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
⑤	KCL注10mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL 1時間
⑥	マンニトールS 300mL 30分
⑦	●ランダ【 】mg 生食 500mL 1時間
⑧	KCL注10mEq 生食 500mL 1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
キイトルーダ	200mg/Body
ランダ	40 mg/m ² mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 75歳未満の患者を対象とする。
- 腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。
- 点滴ルートはフィルター付き輸液ルートを使用すること。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)は

day2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,30,31,32,37,38,39に投与する。

- 糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)を day1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31,32,36,37,38,39に投与する。