

イムデトラ療法【1コース目】(Day1)
【呼吸器科】152-1【小細胞肺癌】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~28
施行日	/	/	/	
イムデトラ	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①		デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 1時間
②		●イムデトラ【 】mg 注射用水 生食 236mL 1時間 ※生食250mLから14mLを抜き取った後、 製品添付の輸液安定化液13mLを加える。 ※イムデトラ1Vあたり注射用水1.3mLで溶解し、 (溶解後濃度0.9mg/mL) 1.1mLを生食に注入する。
③		生食 1000mL 5時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
イムデトラ	《Day1》 1mg/Body 《Day8,15以降》 10mg/Body

■注意・確認事項

- イムデトラ投与によりサイトカイン放出症候群(CRS)が起こる場合があるので注意すること。
- CRSは投与初期に多く認められることから、少なくとも1日目及び8日目は、本剤投与開始から24時間は必ず入院管理とし、1日目投与24時間経過後及び15日目以降の投与後も患者の状態に応じて入院管理を検討すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師