

# イムデトラ療法【2コース目以降】

## 【呼吸器科】153【小細胞肺癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	~28
施行日	/	/	/		
イムデトラ	↓	休薬	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">生食 50mL</div> 10分
②	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     ●イムデトラ【           】mg                      注射用水                      生食 233mL                 </div> 1時間 <small>※生食250mLから17mLを抜き取った後、                      製品添付の輸液安定化液13mLを加える                      ※イムデトラ1Vあたり注射用水4.4mLで溶解し、                      (溶解後濃度2.4mg/mL)4.2mLを生食に注入する。</small>
③	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">生食 50mL</div> 10分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
イムデトラ	10mg/Body

■注意・確認事項

○イムデトラ投与によりサイトカイン放出症候群(CRS)が起こる場合があるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師