

Pola+BR(BS)療法(体重45kg未満)【1コース目】(10分)(Day2)

【血液内科】17-2【悪性リンパ腫】

■エンボス

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/
リツキシマブ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ポライビー	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	
トレアキシシ	休薬	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 4時間
※①	10時	同時に側管より カロナール内服 → 別途内服オーダー ポラミン注5mg 1A デキサート注1.65mg 2A 生食 100mL 30分
②	10時30分	●ポライビー【 】mg 注射用水 生食 50mL 1時間30分 ※ポライビー30mgは注射用水1.8mLで溶解 ※ポライビー140mgは注射用水7.2mLで溶解 (溶解後濃度:20mg/mL)
③	12時	グラニセトロンバッグ 100mL 30分
④	12時30分	●トレアキシシ【 】mg 生食 50mL 10分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
リツキシマブBS	375mg/m ² mg/Body
ポライビー	1.8mg/kg mg/Body
トレアキシシ	90mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- ポライビー投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- ポライビー初回投与時は90分かけて投与し、忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分まで短縮可。
- トレアキシシは調製後6時間以内に投与を終了すること。
- 最大6サイクル投与とする。

入力 薬剤師	看護師	看護師