

Hyper CVAD (CV用)療法(Day11)

【血液内科】182-11【急性リンパ性白血病】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:

病棟:

医師名:

印

身長:

cm

体重:

kg

体表面積:

m²

Cr:

mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3~4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	8	11	12	13	14	15	~21 or 28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
エンドキサン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
オンコビン	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ドキソルビシン	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
オルガドロン	↓	↓	↓	↓	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 5時間
※①	10時	同時に側管より オルガドロン注19mg 2V グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●オンコビン 2mg 生食 50mL 15分

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
エンドキサン	300mg/m ² × 2	
オンコビン	mg/m ² 2mg/Body	→最高用量 2mg/body
ドキソルビシン	50mg/m ² mg/Body	
オルガドロン	mg/m ² 38mg/Body	

■注意・確認事項

- Hyper CVAD療法とメソトレキセート+シタラビン療法を3~4週間隔で繰り返す。
○中心静脈から投与すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師