

# Hyper CVAD (CV用)療法(Day1,2,3)

## 【血液内科】182-1【急性リンパ性白血病】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

### ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3~4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	8	11	12	13	14	15	~21 or 28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
エンドキサン	↓	↓	↓	休薬							
オンコビン	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
ドキシソルビシン	休薬	休薬	休薬	↓	休薬						
オルガドロン	↓	↓	↓	↓	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬

### ■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



### ■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
エンドキサン	300mg/m <sup>2</sup> × 2
オンコビン	mg/m <sup>2</sup> 2mg/Body → 最高用量 2mg/body
ドキシソルビシン	50mg/m <sup>2</sup> mg/Body
オルガドロン	mg/m <sup>2</sup> 38mg/Body

### ■注意・確認事項

- Hyper CVAD療法とメソトレキセート+シタラビン療法を3~4週間隔で繰り返す。
- 中心静脈から投与すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師