■エンボス

Hyper CVAD (CV用)療法(Day4)

【血液内科】182-4【急性リンパ性白血病】

（第　コース目）

＊網かけ部分は必須記入事項

診療科：	病棟：
医師名：	印

身長：　cm	体重：　kg
体表面積：　㎡	Cr：　mg/dL

■レジメン　下記が1コースの投与スケジュール　：　3～4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	8	11	12	13	14	15	～21	or28
施行日	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／		／
エンドキサン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬		
オンコビン	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬		
ドキソルビシン	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬		
オルガドロン	↓	↓	↓	↓	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬		

■投与順序　※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間
①	2時
※②	10時
※②	10時
※②	10時
③	10時30分
④	10時45分
⑤	18時



■投与量　　※投与量の参考

薬剤名	標準投与量		
エンドキサン	300mg/m2×2		
オンコビン	mg/m²	2mg/Body	→最高用量 2mg/body
ドキソルビシン	50mg/m²	mg/Body	
オルガドロン	mg/m2	38mg/Body	

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意･確認事項

○Hyper CVAD療法とメソトレキセート+シタラビン療法を3～4週間隔で繰り返す。
○中心静脈から投与すること。
○ドキソルビシンは総投与量500mg/㎡を超えると重篤な心筋障害を起こす
　ことが多くなるので注意すること。

○アプレピタントカプセル125mg（レジメンオーダ）はDay4に
アプレピタントカプセル80mg（内服オーダ）はDay5,6に投与する。