

Hyper CVAD (CV用)療法(Day5)

【血液内科】182-5【急性リンパ性白血病】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3~4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	8	11	12	13	14	15	~21 or 28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
エンドキサン	↓	↓	↓	休薬							
オンコビン	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
ドキソルビシン	休薬	休薬	休薬	↓	休薬						
オルガドロン	↓	↓	↓	↓	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
①	2時	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ウロミテキサン400mg 1A ソルデム3A 500mL 8時間 </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">アプレピタントカプセル80mg 1Cap → 別途内服オーダ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ウロミテキサン400mg 1A ソルデム3A 500mL 8時間 </div> <p style="text-align: center;">↓</p>
②	10時	

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
エンドキサン	300mg/m ² × 2	
オンコビン	mg/m ² 2mg/Body	→ 最高用量 2mg/body
ドキソルビシン	50mg/m ² mg/Body	
オルガドロン	mg/m ² 38mg/Body	

■注意・確認事項

○Hyper CVAD療法とメソトレキセート+シタラビン療法を3~4週間隔で繰り返す。

○中心静脈から投与すること。

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダ)はDay4に

アプレピタントカプセル80mg(内服オーダ)はDay5,6に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師