メソトレキセート+シタラビン療法(Day2)

【血液内科】183-2【急性リンパ性白血病】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3~4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	8	15	~21 or28
施行日	/	/	/	/	/	/
メソトレキセート	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
シタラビン	休薬	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	投与内容
		メイン輸液 ※臨時処方では別オーダー
※①	10時	アプレピタントCap125mg 1Cap ソル・メドロール注40mg 1V グラニセロンバッグ 100mL 30分
※①	10時	
②	10時30分	●シタラビン()mg 生食 500mL 3時間
③	22時	ソル・メドロール注40mg 1V グラニセロンバッグ 100mL 30分
④	22時30分	●シタラビン()mg 生食 500mL 3時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
①メソトレキセート	200mg/m ² mg/Body
②メソトレキセート	800mg/m ² mg/Body
シタラビン	3000mg/m ² × 2

※60歳以上1000mg/m²に減量

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○Hyper CVAD療法とメソトレキセート+シタラビン療法を3~4週間隔で繰り返す

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay2に

アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay3,4に投与する。