

ALL202-O寛解導入療法(Day2)

【血液内科】184-2【急性リンパ性白血病】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	8	9	11	13	15	16	18	20	21	22	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
オンコビン	↓	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	
ダウノマイシン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
エンドキサン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
ロイナーゼ	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	↓	休薬	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬
プレドニン	経口: Day1-21 (※60歳以上: 1週間)												休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
		メイン輸液 ※臨時処方では別オーダー
①	10時	← グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	← ●ダウノマイシン【 】mg 生食 100mL 1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
オンコビン	1.3mg/m ² mg/Body
ダウノマイシン	60mg/m ² mg/Body
エンドキサン	1200mg/m ² mg/Body
ロイナーゼ	3000KU/m ² mg/Body
プレドニン(経口)	60mg/m ² mg/Body

→最高用量 2mg/body

※60歳以上: 30mg/m²※60歳以上: 800mg/m²

※Day1-21服用(60歳以上: 1週間のみ服用)

■注意・確認事項

○ダウノマイシンは総投与量25mg/kgを超えると重篤な心筋障害を起こすことが多くなるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師