

ALL202-O寛解導入療法(Day3)

【血液内科】184-3【急性リンパ性白血病】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:

病棟:

医師名:

印

身長:

cm

体重:

kg

体表面積:

m²

Cr:

mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	8	9	11	13	15	16	18	20	21	22	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
オンコビン	↓	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	
ダウノマイシン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
エンドキサン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
ロイナーゼ	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	↓	休薬	↓	↓	↓	休薬	休薬	
プレドニン	経口: Day1-21 (※60歳以上: 1週間)												休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
		メイン輸液
①	10時	グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●ダウノマイシン【 】mg 1時間 生食 100mL

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
オンコビン	1.3mg/m ² mg/Body
ダウノマイシン	60mg/m ² mg/Body
エンドキサン	1200mg/m ² mg/Body
ロイナーゼ	3000KU/m ² mg/Body
プレドニン(経口)	60mg/m ² mg/Body

→最高用量 2mg/body

※60歳以上: 30mg/m²※60歳以上: 800mg/m²

※Day1-21服用(60歳以上: 1週間のみ服用)

■注意・確認事項

○ダウノマイシンは総投与量25mg/kgを超えると重篤な心筋障害を起こす
ことが多くなるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師