

# ALL202-O地固め(C2-5 Arm A)療法 (Day1,15)

## 【血液内科】186-1,15【急性リンパ性白血病】 (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
メソトレキセート	↓	休薬	↓	
オンコビン	↓	休薬	↓	
メソトレキセート(髄注)	↓	休薬	↓	
デキサート(髄注)	↓	休薬	↓	
ロイケリン	経口: Day1-21			

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
メソトレキセート	3000mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
オンコビン	1.3mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
メソトレキセート(髄注)	mg/m <sup>2</sup>	15mg/Body
デキサート(髄注)	mg/m <sup>2</sup>	3.3mg/Body
ロイケリン(経口)	25mg/m <sup>2</sup>	mg/Body

※50歳以上1500mg/m<sup>2</sup>に減量

→最高用量 2mg/body

※Day1-21服用

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay1,15に

アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay2,3,16,17に投与する。

○ロイコポリンレスキューについては別途指示を確認すること