

ALL202-O地固め(C2・5 Arm B)療法(Day1,15)

【血液内科】187-1,15【急性リンパ性白血病】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
メソトレキセート	↓	休薬	↓	
オンコビン	↓	休薬	↓	
メソトレキセート(髄注)	↓	休薬	↓	
デキサート(髄注)	↓	休薬	↓	
ロイケリン	経口: Day1-21			

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
		メイン輸液 ※臨時処方では別オーダー
①	10時	グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●オンコビン【 】mg 15分 生食 50mL ※MTX開始1時間前に投与
③	11時30分	●メソトレキセート①【 】mg 2時間 生食 100mL
※④	13時30分	●メソトレキセート②【 】mg 22時間 生食 500mL
※④	13時30分	●メソトレキセート 15mg デキサート注1.65mg 2A 髄腔内注入 生食 ※全量5mLとする ※MTX開始2時間後から終了までの間に投与

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
メソトレキセート①	100mg/m ² mg/Body
メソトレキセート②	400mg/m ² mg/Body
オンコビン	1.3mg/m ² mg/Body
メソトレキセート(髄注)	mg/m ² 15mg/Body
デキサート(髄注)	mg/m ² 3.3mg/Body
ロイケリン(経口)	25mg/m ² mg/Body

→最高用量 2mg/body

※Day1-21服用

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師