

ALL202-O地固め(C3)療法(Day1)

【血液内科】188-1【急性リンパ性白血病】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 6週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	29	30	...	33	36	...	40	~42
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
オンコピン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
ドキソルビシン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
メソトレキセート(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
キロサイド(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
デキサート(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
デカドロン(経口)	経口:Day1-8		経口:Day15-22		休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
エンドキサン	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
キロサイド	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	...	↓	↓	...	↓	↓
ロイケリン	休薬	休薬	休薬	休薬	経口:Day29-42							

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
1日1回(投与時間指示あり)		●メソトレキセート 15mg ●キロサイド 40mg デキサート注1.65mg 2A 生食 髄腔内注入 ※全量5mLとする
※①	10時	ソルデム3A 500mL 5時間
※①	10時	同時に側管より グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●オンコピン【 】mg 生食 50mL 15分
③	10時45分	●ドキソルビシン【 】mg 生食 100mL 1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
オンコピン	1.3mg/m ² mg/Body	→最高用量 2mg/body
ドキソルビシン	30mg/m ² mg/Body	
メソトレキセート(髄注)	mg/m ² 15mg/Body	
キロサイド(髄注)	mg/m ² 40mg/Body	
デキサート(髄注)	mg/m ² 3.3mg/Body	
デカドロン(経口)	10mg/m ² mg/Body	
エンドキサン	1000mg/m ² mg/Body	
キロサイド	75mg/m ² mg/Body	
ロイケリン(経口)	60mg/m ² mg/Body	

■注意・確認事項

○ドキソルビシンは総投与量500mg/m²を超えると重篤な心筋障害を起こすことが多くあるので注意すること。

入力薬剤師	看護師	看護師