■エンボス

ALL202-O地固め(C3)療法(Day30～32,37～39)

【血液内科】188-30～32,37～39【急性リンパ性白血病】

(第　コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長: cm	体重: kg
体表面積: ㎡	Cr: mg/dL

■レジメン　下記が1コースの投与スケジュール　:　6週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	29	30	・・・	33	36	・・・	40	～42
施行日	／	／	／	／	／	／		／	／		／	／
オンコビン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬		休薬	休薬		休薬	
ドキソルビシン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬		休薬	休薬		休薬	
メソトレキセート(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬		休薬	休薬		休薬	
キロサイド(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬		休薬	休薬		休薬	
デキサート(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬		休薬	休薬		休薬	
デカドロン(経口)	経口:Day1-8		経口:Day15-22		休薬	休薬		休薬	休薬		休薬	
エンドキサン	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	休薬		休薬	休薬		休薬	
キロサイド	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	・・・	↓	↓	・・・	↓	
ロイケリン	休薬	休薬	休薬	休薬	経口:Day29-42							

■投与順序　※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	↓ ソルデム3A　500mL　12時間
※①	10時	同時に側管より ← グラニセトロンバッグ 100mL　30分
②	10時30分	← ●キロサイド【　　】mg / 生食　250mL　1時間
③	22時	↓ ソルデム3A　500mL　12時間 ↓ 翌日10時まで

■投与量　※投与量の参考

薬剤名	標準投与量		
オンコビン	1.3mg/m²	mg/Body	→最高用量 2mg/body
ドキソルビシン	30mg/m²	mg/Body	
メソトレキセート(髄注)	mg/m2	15mg/Body	
キロサイド(髄注)	mg/m2	40mg/Body	
デキサート(髄注)	mg/m2	3.3mg/Body	
デカドロン(経口)	10mg/m²	mg/Body	
エンドキサン	1000mg/m²	mg/Body	
キロサイド	75mg/m2	mg/Body	
ロイケリン(経口)	60mg/m2	mg/Body	

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師