

ALL202-O地固め(C3)療法(Day33,40)
【血液内科】188-33,40【急性リンパ性白血病】
(第 コース目)


*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 6週ごとを1コースとする												
Day	1	8	15	22	29	30	...	33	36	...	40	~42
施行日	/	/	/	/	/	/		/	/		/	/
オンコピン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬		休薬	休薬		休薬	休薬
ドキソルビシン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬		休薬	休薬		休薬	休薬
メソトレキサート(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬		休薬	休薬		休薬	休薬
キロサイド(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬		休薬	休薬		休薬	休薬
デキサート(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬		休薬	休薬		休薬	休薬
デカドロン(経口)	経口 : Day1-8		経口 : Day15-22		休薬	休薬		休薬	休薬		休薬	休薬
エンドキサン	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	休薬		休薬	休薬		休薬	休薬
キロサイド	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	...	↓	↓	...	↓	↓
ロイケリン	休薬	休薬	休薬	休薬	経口 : Day29-42							

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量		※投与量の参考	
薬剤名	標準投与量		→最高用量 2mg/body
オンコピン	1.3mg/m ²	mg/Body	
ドキソルビシン	30mg/m ²	mg/Body	
メソトレキセート(髄注)	mg/m2	15mg/Body	
キロサイド(髄注)	mg/m2	40mg/Body	
デキサート(髄注)	mg/m2	3.3mg/Body	
デカドロン(経口)	10mg/m ²	mg/Body	
エンドキサン	1000mg/m ²	mg/Body	
キロサイド	75mg/m2	mg/Body	
ロイケリン(経口)	60mg/m2	mg/Body	

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師