

ALL202-O地固め(C3)療法 (Day36)

【血液内科】188-36【急性リンパ性白血病】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印


身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン

下記が1コースの投与スケジュール : 6週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	29	30	...	33	36	...	40	~42
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
オンコビン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
ドキソルビシン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
メソトレキセート(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
キロサイド(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
デキサート(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
デカドロン(経口)	経口: Day1-8		経口: Day15-22		休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
エンドキサン	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
キロサイド	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	...	↓	↓	...	↓	↓
ロイケリン	休薬	休薬	休薬	休薬	経口: Day29-42							

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
オンコビン	1.3mg/m ² mg/Body
ドキソルビシン	30mg/m ² mg/Body
メソトレキセート(髄注)	mg/m2 15mg/Body
キロサイド(髄注)	mg/m2 40mg/Body
デキサート(髄注)	mg/m2 3.3mg/Body
デカドロン(経口)	10mg/m ² mg/Body
エンドキサン	1000mg/m ² mg/Body
キロサイド	75mg/m2 mg/Body
ロイケリン(経口)	60mg/m2 mg/Body

→最高用量 2mg/body

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師