

ALL202-O地固め(C3)療法 (Day8,15)

【血液内科】188-8,15【急性リンパ性白血病】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 6週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	29	30	...	33	36	...	40	~42
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
オンコピン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
ドキソルビシン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
メソトレキサート(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
キロサイド(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
デキサート(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
デカドロン(経口)	経口: Day1-8		経口: Day15-22		休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
エンドキサン	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
キロサイド	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	...	↓	↓	...	↓	↓
ロイケリン	休薬	休薬	休薬	休薬	経口: Day29-42							

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
オンコピン	1.3mg/m ² mg/Body → 最高用量 2mg/body
ドキソルビシン	30mg/m ² mg/Body
メソトレキサート(髄注)	mg/m ² 15mg/Body
キロサイド(髄注)	mg/m ² 40mg/Body
デキサート(髄注)	mg/m ² 3.3mg/Body
デカドロン(経口)	10mg/m ² mg/Body
エンドキサン	1000mg/m ² mg/Body
キロサイド	75mg/m ² mg/Body
ロイケリン(経口)	60mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

○ドキソルビシンは総投与量500mg/m²を超えると重篤な心筋障害を起こすことが多いので注意すること。

入力薬剤師	看護師	看護師