

Ph+ALL213強化地固め療法(Day2)

【血液内科】190-2【急性リンパ性白血病】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 37日ごとを1コースとする

Day	1	2	3	8	15	22	29	~37
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/
エンドキサン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
ダウノマイシン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
オンコビン	↓	休薬	休薬	↓	↓	↓	休薬	
メソトレキセート(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
デキサート(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
プレドニン	経口: Day1-28 (※Day22-28 漸減)						休薬	
スプリセル	休薬	休薬	休薬	経口: Day4-31				

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
オンコビン	1.3mg/m ² mg/Body	→最高用量 2mg/body
ダウノマイシン	45mg/m ² mg/Body	※60歳以上: 30mg/m ²
エンドキサン	1200mg/m ² mg/Body	※60歳以上: 900mg/m ²
メソトレキセート(髄注)	mg/m ² 15mg/Body	
デキサート(髄注)	mg/m ² 3.3mg/Body	
プレドニン(経口)	≪Day1-21≫ 60mg/m ²	※60歳以上: 45mg/m ²
	≪Day22,23≫ 30mg/m ²	
	≪Day24,25≫ 15mg/m ²	
	≪Day26-28≫ 5mg/m ²	
スプリセル(経口)	100mg/body (1日1回)	※Day4-31服用

■注意・確認事項

○ダウノマイシンは総投与量25mg/kgを超えると重篤な心筋障害を起こすことが多くなるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師