

Ph+ALL213強化地固め療法(Day8,15,22)

【血液内科】190-8,15,22【急性リンパ性白血病】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 37日ごとを1コースとする								
Day	1	2	3	8	15	22	29	~37
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/
エンドキサン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
ダウノマイシン	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
オンコビン	↓	休薬	休薬	↓	↓	↓	休薬	
メソトレキセート(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
デキサート(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
プレドニン	経口: Day1-28 (※Day22-28 漸減)						休薬	
スプリセル	休薬	休薬	休薬	経口: Day4-31				

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 200mL 2時間
※①	10時	同時に 側管より グラニセロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●オンコビン【 】mg 15分 生食 50mL

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
オンコビン	1.3mg/m ²	mg/Body
ダウノマイシン	45mg/m ²	mg/Body
エンドキサン	1200mg/m ²	mg/Body
メソトレキセート(髄注)	mg/m ²	15mg/Body
デキサート(髄注)	mg/m ²	3.3mg/Body
プレドニン(経口)	≪Day1-21≫	60mg/m ²
	≪Day22,23≫	30mg/m ²
	≪Day24,25≫	15mg/m ²
	≪Day26-28≫	5mg/m ²
スプリセル(経口)	100mg/body (1日1回)	

→最高用量 2mg/body
※60歳以上: 30mg/m²
※60歳以上: 900mg/m²

※60歳以上: 45mg/m²

※Day4-31服用

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師