

Ph+ALL213地固め(C1)療法(Day2,3)

【血液内科】191-2,3【急性リンパ性白血病】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 30日ごとを1コースとする

Day	1	2	3	~30
施行日	/	/	/	/
メソトレキセート	↓	休薬	休薬	
シタラビン	休薬	↓	↓	
ソル・メドロール	↓	↓	↓	
メソトレキセート(髄注)	↓	休薬	休薬	
デキサート(髄注)	↓	休薬	休薬	
スプリセル	休薬	休薬	休薬	経口:Day4-24

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	投与内容
		メイン輸液 ※臨時処方別オーダー
①	10時	アプレピタントカプセル80mg 1Cap → 別途内服オーダー ソル・メドロール注40mg 1V グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●シタラビン【 】mg 生食 500mL 3時間
③	22時	ソル・メドロール注40mg 1V グラニセトロンバッグ 100mL 30分
④	22時30分	●シタラビン【 】mg 生食 500mL 3時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
メソトレキセート①	100mg/m ²	mg/Body
メソトレキセート②	900mg/m ²	mg/Body
シタラビン	2000mg/m ² × 2	
ソル・メドロール	40mg/body × 2	
メソトレキセート(髄注)	mg/m ²	15mg/Body
デキサート(髄注)	mg/m ²	3.3mg/Body
スプリセル(経口)	100mg/body (1日1回)	

※60歳以上1000mg/m²に減量

※Day4-24服用

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay1に
アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay2,3に投与する。