

Ph+ALL213維持療法

【血液内科】193【急性リンパ性白血病】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 5週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	29	~35
施行日	/	/	/	/	/	/
オンコビン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
プレドニン	経口: Day1-14 (※Day8-14 漸減)	休薬	休薬	休薬	休薬	
スプリセル	経口: Day1-28					

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 200mL 2時間
※①	10時	同時に 側管より グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●オンコビン【 】mg 15分 生食 50mL

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
オンコビン	1.3mg/m ² mg/Body	→最高用量 2mg/body
プレドニン(経口)	《Day1-7》	60mg/m ²
	《Day8,9》	30mg/m ²
	《Day10,11》	15mg/m ²
	《Day12-14》	5mg/m ²
スプリセル(経口)	100mg/body (1日1回)	※Day1-28服用

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師