

Ph(-)B-ALL213寛解導入療法(Day15)

【血液内科】194-15【急性リンパ性白血病】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 5週ごとを1コースとする

Day	1	8	9	10	15	17	19	21	22	23	25	27	28	29	~35
施行日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
オンコピン	休薬	↓	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	
ダウノマイシン	休薬	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
エンドキサン	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
ロイナーゼ	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	↓	↓	↓	休薬	↓	
メソトレキセート(髄注)	休薬	↓	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
キロサイド(髄注)	休薬	↓	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
デキサート(髄注)	休薬	↓	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
プレドニン	経口:Day1-7	経口:Day8-28 (※45歳以上:Day8-21 ※60歳以上:Day8-14)													7日間かけて漸減

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
1日1回 (投与時間指示あり)		
※①	10時	ソルデム3A 500mL 6時間
※①	10時	同時に側管より グラニセロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●オンコピン【 】mg 生食 50mL 15分
③	10時45分	●ロイナーゼ【 】KU 注射用水 20mL 5%ブドウ糖 500mL 4時間 ※ロイナーゼ1Vを注射用水5mLで溶解

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
オンコピン	1.3mg/m ² mg/Body
ダウノマイシン	45mg/m ² mg/Body
エンドキサン	1200mg/m ² mg/Body
ロイナーゼ	5000KU/m ² mg/Body
メソトレキセート(髄注)	mg/m ² 15mg/Body
キロサイド(髄注)	mg/m ² 40mg/Body
デキサート(髄注)	mg/m ² 3.3mg/Body
プレドニン(経口)	60mg/m ² mg/Body

→最高用量 2mg/body
※60歳以上:30mg/m²
※60歳以上:800mg/m²
※60歳以上:3000KU/m²

※7日間の先行投与後、Day8-28服用(45歳以上:Day8-21服用 60歳以上:Day8-14服用)
年齢に応じた服用期間終了後は、漸減し7日間を終了

■注意・確認事項

★PSL内服先行レジメン 「注:D1」=「内:D8」

○ショックが現れる恐れがあるため、初回のロイナーゼ投与に先立って皮内反応試験(調製・投与方法等は別紙参照)を実施することが望ましい。

入力 薬剤師	看護師	看護師