

Ph(-)B-ALL213寛解導入療法(Day8)

【血液内科】194-8【急性リンパ性白血病】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 5週ごとを1コースとする

Day	1	8	9	10	15	17	19	21	22	23	25	27	28	29	~35
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
オンコピン	休薬	↓	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	休薬
ダウノマイシン	休薬	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬							
エンドキサン	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬									
ロイナーゼ	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	↓	休薬	↓	↓	↓	休薬	↓	休薬	↓
メソトレキセート(髄注)	休薬	↓	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬						
キロサイド(髄注)	休薬	↓	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬						
デキサート(髄注)	休薬	↓	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬						
プレドニン	経口:Day1-7	経口:Day8-28 (※45歳以上:Day8-21 ※60歳以上:Day8-14)										7日間かけて漸減			

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
オンコピン	1.3mg/m ²	mg/Body
ダウノマイシン	45mg/m ²	mg/Body
エンドキサン	1200mg/m ²	mg/Body
ロイナーゼ	5000KU/m ²	mg/Body
メソトレキセート(髄注)	mg/m ²	15mg/Body
キロサイド(髄注)	mg/m ²	40mg/Body
デキサート(髄注)	mg/m ²	3.3mg/Body
プレドニン(経口)	60mg/m ²	mg/Body

→最高用量 2mg/body
※60歳以上:30mg/m²
※60歳以上:800mg/m²
※60歳以上:3000KU/m²

※7日間の先行投与後、Day8-28服用(45歳以上:Day8-21服用 60歳以上:Day8-14服用)
年齢に応じた服用期間終了後は、漸減し7日間を終了

■注意・確認事項

★PSL内服先行レジメン 「注:D1」=「内:D8」

○ダウノマイシンは総投与量25mg/kgを超えると重篤な心筋障害を起こす
ことが多くなるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師