

Ph(-)B-ALL213地固め(C1・4)療法 (Day2,3)

【血液内科】195-2,3【急性リンパ性白血病】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 1コース目と4コース目に同じ治療を繰り返す

Day	1	2	3	4	~
施行日	/	/	/	/	/
シタラビン	↓	↓	↓	休薬	
ベブシド	↓	↓	↓	休薬	
オルガドロン	↓	↓	↓	休薬	
ロイナーゼ	休薬	休薬	休薬	↓	
メソトレキセート(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	
キロサイド(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	
デキサート(髄注)	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
シタラビン	2000mg/m ² × 2
ベブシド	100mg/m ² mg/Body
オルガドロン	mg/m ² 38mg/Body
ロイナーゼ	10000KU/m ² mg/Body
メソトレキセート(髄注)	mg/m ² 15mg/Body
キロサイド(髄注)	mg/m ² 40mg/Body
デキサート(髄注)	mg/m ² 3.3mg/Body

※60歳以上:1000mg/m²

※60歳以上:5000KU/m²

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師