

Ph(-)B-ALL213地固め(C2・5)療法 (Day1,15)

【血液内科】196-1,15【急性リンパ性白血病】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 2コース目と5コース目に同じ治療を繰り返す

Day	1	3	8	15	17	~21
施行日	/	/	/	/	/	/
メソトレキセート	↓	休薬	休薬	↓	休薬	
オンコビン	↓	休薬	休薬	↓	休薬	
ロイナーゼ	休薬	↓	休薬	休薬	↓	
メソトレキセート(髄注)	↓	休薬	休薬	↓	休薬	
キロサイド(髄注)	↓	休薬	休薬	↓	休薬	
デキサート(髄注)	↓	休薬	休薬	↓	休薬	
ロイケリン	経口: Day1-21					

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
1日1回 (投与時間指示あり)		
※①	10時	●メソトレキセート 15mg ●キロサイド 40mg デキサート注1.65mg 2A 生食 髄腔内注入 ※全量5mLとする
※①	10時	
②	10時30分	メイン輸液 ※臨時処方では別オーダー アプレピタントCap125mg 1Cap グラニセロンバッグ 100mL 30分
③	11時30分	●オンコビン【 】mg 生食 50mL 15分 ●メソトレキセート【 】mg 生食 500mL 24時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
メソトレキセート	3000mg/m ² mg/Body
オンコビン	1.3mg/m ² mg/Body
ロイナーゼ	10000KU/m ² mg/Body
メソトレキセート(髄注)	mg/m ² 15mg/Body
キロサイド(髄注)	mg/m ² 40mg/Body
デキサート(髄注)	mg/m ² 3.3mg/Body
ロイケリン(経口)	25mg/m ² mg/Body

※50歳以上: 1500mg/m²
→最高用量 2mg/body
※60歳以上: 5000KU/m²

※Day1-21服用

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay1,15に

アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay2,3,16,17に投与する。

○ロイコボリンレスキューについては別途指示を確認すること