

Ph(-)B-ALL213地固め(C2・5)療法 (Day3,17)

【血液内科】196-3,17【急性リンパ性白血病】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項


| | |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印 |

| | | | |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長: | cm | 体重: | kg |
| 体表面積: | m ² | Cr: | mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 2コース目と5コース目に同じ治療を繰り返す

| Day | 1 | 3 | 8 | 15 | 17 | ~21 |
|--------------|-------------|----|----|----|----|-----|
| 施行日 | / | | / | / | | / |
| メソトレキセート | ↓ | 休薬 | 休薬 | ↓ | 休薬 | |
| オンコビン | ↓ | 休薬 | 休薬 | ↓ | 休薬 | |
| ロイナーゼ | 休薬 | ↓ | 休薬 | 休薬 | ↓ | |
| メソトレキセート(髄注) | ↓ | 休薬 | 休薬 | ↓ | 休薬 | |
| キロサイド(髄注) | ↓ | 休薬 | 休薬 | ↓ | 休薬 | |
| デキサート(髄注) | ↓ | 休薬 | 休薬 | ↓ | 休薬 | |
| ロイケリン | 経口: Day1-21 | | | | | |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名 | 標準投与量 | 参考 |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| メソトレキセート | 3000mg/m ² mg/Body | ※50歳以上: 1500mg/m ² |
| オンコビン | 1.3mg/m ² mg/Body | →最高用量 2mg/body |
| ロイナーゼ | 10000KU/m ² mg/Body | ※60歳以上: 5000KU/m ² |
| メソトレキセート(髄注) | mg/m ² 15mg/Body | |
| キロサイド(髄注) | mg/m ² 40mg/Body | |
| デキサート(髄注) | mg/m ² 3.3mg/Body | |
| ロイケリン(経口) | 25mg/m ² mg/Body | ※Day1-21服用 |

■注意・確認事項

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay1,15に
アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay2,3,16,17に投与する。

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 入力 薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
| | | |