

Ph(-)B-ALL213維持療法

【血液内科】198【急性リンパ性白血病】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:

病棟:

医師名:

印

身長:

cm

体重:

kg

体表面積:

m²

Cr:

mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
オンコビン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
プレドニン(経口)	経口: Day1-5					休薬	休薬	休薬	
メソトレキセート(経口)	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	↓	
ロイケリン(経口)	経口: Day1-28								

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 200mL 2時間
※①	10時	同時に側管より グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●オンコビン【 】mg 生食 50mL 15分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
オンコビン	1.3mg/m ² mg/Body	→最高用量 2mg/body
プレドニン(経口)	60mg/m ² mg/Body	
メソトレキセート(経口)	20mg/m ² mg/Body	※就寝前又は朝食後服用
ロイケリン(経口)	60mg/m ² mg/Body	※就寝前服用

■注意・確認事項

○投与期間は寛解導入療法開始日より満2年の日まで

入力 薬剤師	看護師	看護師