

# ABVd療法

## 【血液内科】2【悪性リンパ腫】 (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/
エクザール	↓	休薬	↓	休薬	
ドキソルビシン	↓	休薬	↓	休薬	
ブレオ	↓	休薬	↓	休薬	
ダカルバジン	↓	休薬	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
エクザール	6mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ドキソルビシン	25mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ブレオ	10mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ダカルバジン	250mg/m <sup>2</sup>	mg/Body

■注意・確認事項

○ドキソルビシンは総投与量500mg/m<sup>2</sup>を超えると重篤な心筋障害を起こすことが多くなるので注意すること。

○ダカルバジン投与時は輸液バッグ・ルート共に遮光(血管痛防止のため)

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダ)はDay1,15に

アプレピタントカプセル80mg(内服オーダ)はDay2,3,16,17に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師