

ビーリンサイト(45kg未満)療法【2～5コース目】(Day1)

■エンボス

【血液内科】204-1【急性リンパ性白血病】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 6週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	...	28	...	~42
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/		/		/
ビーリンサイト	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	...	↓		

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
①	10時	オルガドロン注19mg 1V 生食 100mL ※ビーリンサイトとは別ルートより投与
②	10時30分	●ビーリンサイト【 】μg 注射用水 生食 20mL 生食合計270mL 生食 250mL 投与速度: 10mL/hr、24時間で更新(残破棄) ※ビーリンサイト1V当り注射用水3mLで溶解 (溶解後濃度: 12.5 μg/mL) ※生食270mLに製品添付の輸液安定化液5.5mLを加える

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ビーリンサイト	15 μg/m ² μg/Body

→ 最高用量 28 μg/body

■注意・確認事項

- 中心静脈ルート(ダブルルーメンorトリプルルーメン使用)より投与
- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- ビーリンサイトは単独ルートから投与、輸液ポンプを使用すること(投与速度: 10mL/hr)。
- 輸液バッグ交換時や投与終了時にルートをフラッシュしないこと。
- ★輸液を全量投与すると過量投与になるため、投与速度及び更新時間厳守。残液は破棄。

入力 薬剤師	看護師	看護師