

ビーリンサイト(45kg未満)療法【6～9コース目】(Day1)

■エンボス

【血液内科】205-1【急性リンパ性白血病】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 12週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	7	8	...	28	~84
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	...	/	/
ビーリンサイト	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	...	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間									
①	10時	<table border="1"> <tr> <td>オルガドロン注19mg 1V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生食 100mL</td> <td>30分</td> </tr> </table> <p>※ビーリンサイトとは別ルートより投与</p>	オルガドロン注19mg 1V		生食 100mL	30分				
オルガドロン注19mg 1V										
生食 100mL	30分									
②	10時30分	<table border="1"> <tr> <td>●ビーリンサイト【 】μg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>注射用水</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生食 20mL</td> <td>生食合計270mL</td> </tr> <tr> <td>生食 250mL</td> <td></td> </tr> </table> <p>投与速度: 10mL/hr、24時間で更新(残破棄)</p> <p>※ビーリンサイト1V当り注射用水3mLで溶解 (溶解後濃度: 12.5 μg/mL) ※生食270mLに製品添付の輸液安定化液5.5mLを加える</p>	●ビーリンサイト【 】μg		注射用水		生食 20mL	生食合計270mL	生食 250mL	
●ビーリンサイト【 】μg										
注射用水										
生食 20mL	生食合計270mL									
生食 250mL										

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ビーリンサイト	15 μg/m ² μg/Body → 最高用量 28 μg/body

■注意・確認事項

- 中心静脈ルート(ダブルルーメンorトリプルルーメン使用)より投与
- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- ビーリンサイトは単独ルートから投与、輸液ポンプを使用すること(投与速度: 10mL/hr)。
輸液バッグ交換時や投与終了時にルートをフラッシュしないこと。
- ★輸液を全量投与すると過量投与になるため、投与速度及び更新時間厳守。残液は破棄。

入力 薬剤師	看護師	看護師