

【CRS】アクテムラ療法(体重:30kg以上)

■エンボス

【血液内科】217【悪性腫瘍治療に伴うサイトカイン放出症候群】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 週ごとを1コースとする

Day	1
施行日	/
アクテムラ	↓

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
①	10時	生食 50mL 10分
②	10時10分	●アクテムラ【 】mg 生食 100mL 1時間
③	11時10分	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
アクテムラ	8mg/kg mg/Body

※1回800mgを超えないこと

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 輸液ポンプ使用。投与開始時は緩徐に点滴静注を行い、アナフィラキシー様症状がないことを確認後、点滴速度を速め、1時間程度で投与を終了する。
《アクテムラの投与速度》
30mL/hrで開始 ⇒ 15分後 160mL/hrへ
- 初回投与から8時間以上経過後に再投与可(24時間以内に最大2回)

入力 薬剤師	看護師	看護師