

CHOEP療法(Day1)

【血液内科】22-1【悪性リンパ腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	5	8	15	~21
施行日	/			/	/	/	/
オンコビン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
ドキソルビシン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
エンドキサン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
ベプシド	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
プレドニン	↓	経口: Day2-5			休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	投与内容	時間
※①	10時	ソルデム3A 500mL	6時間
※①	10時	同時に側管より プレドニン注20mg 5A グラニセトロンバッグ 100mL	30分
②	10時30分	●オンコビン【 】mg 生食 50mL	15分
③	10時45分	●ドキソルビシン【 】mg 生食 100mL	30分
④	11時15分	●エンドキサン【 】mg 生食 500mL	2時間
⑤	13時15分	●ベプシド【 】mg 生食 500mL	2時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
オンコビン	1.4mg/m ²	mg/Body
ドキソルビシン	50mg/m ²	mg/Body
エンドキサン	750mg/m ²	mg/Body
ベプシド	100mg/m ²	mg/Body
プレドニン	mg/m ²	100mg/Body

→最高用量 2mg/body

■注意・確認事項

○ドキソルビシンは総投与量500mg/m²を超えると重篤な心筋障害を起こすことが多くなるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師