

postCY療法

【血液内科】231【移植後GVHD予防】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 移植後3日目、4日目に投与

Day	1	2	~
施行日	/	/	/
エンドキサン	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
		メイン輸液 ※臨時処方では別オーダー
①	10時	← グラニセトンバッグ 100mL 30分
②	10時25分	← ●ウロミテキサン【 】mg 全開 生食 50mL
③	10時30分	← ●エンドキサン【 】mg 3時間 生食 500mL
④	14時30分	← ●ウロミテキサン【 】mg 全開 生食 50mL
⑤	18時30分	← ●ウロミテキサン【 】mg 全開 生食 50mL
⑥	22時	← グラニセトンバッグ 100mL 30分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
エンドキサン	50mg/kg mg/Body

■注意・確認事項

- 中心静脈から投与すること。
- ウロミテキサンはエンドキサン投与直前と4時間後、8時間後に投与すること。
- ウロミテキサンの1回量はエンドキサンの40%の量(mg)
- 2日目のエンドキサン投与終了までステロイド投与禁

入力 薬剤師	看護師	看護師