

R(BS)-CHOP療法(Day2)

【血液内科】24-2【悪性リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:

病棟:

医師名:

印

身長:

cm

体重:

kg

体表面積:

m²

Cr:

mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	6	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/
リツキシマブBS	↓	休薬		休薬	休薬	
オンコビン	休薬	↓		休薬	休薬	
ドキソルビシン	休薬	↓		休薬	休薬	
エンドキサン	休薬	↓		休薬	休薬	
プレドニン	休薬	↓	経口: Day3-6	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 5時間
※①	10時	同時に 側管より プレドニン注20mg 5A グラニセロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●オンコビン【 】mg 生食 50mL 15分
③	10時45分	●ドキソルビシン【 】mg 生食 100mL 30分
④	11時15分	●エンドキサン【 】mg 生食 500mL 2時間

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
リツキシマブBS	375mg/m ² mg/Body
オンコビン	1.4mg/m ² mg/Body →最高用量 2mg/body
ドキソルビシン	50mg/m ² mg/Body
エンドキサン	750mg/m ² mg/Body
プレドニン	mg/m ² 100mg/Body

■注意・確認事項

○ドキソルビシンは総投与量500mg/m²を超えると重篤な心筋障害を起こす
ことが多くなるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師